

梅毒相關流行病學資料

- 一、107 至 112 年 65 歲以下梅毒確定病例數分別為 7,777、7,301、6,989、7,656、8,014、8,277 例，112 年 65 歲以下梅毒確定病例數較 111 年增加 3.3%，其中女性增幅為 46.3%，高於男性(-0.5%)。在 65 歲以下梅毒確定病例性別方面，112 年男性 7,323 例(88.5%)，女性 954 例(11.5%)，男女比例為 7.7：1。(如圖 1、圖 2)

圖 1：107 至 112 年 65 歲以下梅毒確定病例數趨勢-依性別




圖 2：112 年 65 歲以下梅毒確定病例個案性別比



二、107-112 年 65 歲以下活性梅毒(含一期梅毒、二期梅毒、三期梅毒)確定病例數分別為 1,592、1,370、1,294、1,575、1,560、1,622 例，112 年相較於 111 年增加 4.0%，其中女性增幅為 91.3%，高於男性(-0.07%)。在活性梅毒確定病例性別方面，112 年男性 1,490 例(91.9%)，女性 132 例(8.1%)，男女比例為 11.3：1。(如圖 3、圖 4)

圖 3：107 至 112 年 65 歲以下活性梅毒確定病例數趨勢-依性別




圖 4：112 年 65 歲以下活性梅毒確定病例個案性別比



三、依 65 歲以下梅毒及活性梅毒確診通報病例年齡層部分，以 25-34 歲為最多，其次為 35-44 歲、15-24 歲次之。在 65 歲以下梅毒確定病例數部分，以 15-24 歲病例數增幅較高；在 65 歲以下活性梅毒確定病例數部分，各年齡層皆有上升。(如圖 5、圖 6)

圖 5：107-112 年 65 歲以下梅毒確定病例數趨勢-依年齡層






圖 6：107-112 年 65 歲以下活性梅毒確定病例數趨勢-依年齡層



四、再依梅毒/活性梅毒確診通報病例之性別及年齡層進一步分析，65 歲以下男性及女性各年齡層狀況如下：


(一)男性 65 歲以下梅毒病例之年齡層分布以 25-44 歲為多，112 年總計有 4,994 例(占 68.2%)，112 年相較於 111 年以 15-24 歲確定病例數增加最為明顯，增幅為 7.5%為最多。(如圖 7)

圖 7：107-112 年男性 65 歲以下梅毒確定病例數趨勢-依年齡層




(二)男性 65 歲以下活性梅毒病例之年齡層分布亦以 25-44 歲為多，112 年總計有 1,065 例(占 71.5%)。(如圖 8)

圖 8：107-112 年男性 65 歲以下活性梅毒確定病例數趨勢-依年齡層




(三)女性 65 歲以下梅毒病例之年齡層分布以 15-34 歲為多，112 年總計有 554 例(占 58.1%)，112 年相較於 111 年女性梅毒疫情呈上升趨勢，其中 34 歲以下年齡層增幅較多。(如圖 9)

圖 9：107-112 年女性 65 歲以下**梅毒**確定病例數趨勢-依年齡層



(四)女性 65 歲以下活性梅毒病例之年齡層分布以 15-34 歲為多，112 年總計有 94 例(占 71.2%)，112 年相較於 111 年女性活性梅毒疫情亦呈上升趨勢，其中 15-44 歲年齡層增幅較多。(如圖 10)

圖 10：107-112 年女性 65 歲以下**活性梅毒**確定病例數趨勢-依年齡層



五、依 65 歲以下梅毒確診通報病例地區分布(如表 1)，112 年確診通報病例之居住地以 6 都為多(占 78.8%)，上升幅度較高縣市為嘉義縣、基隆市、桃園市及臺東縣。

表 1：各縣市 107-112 年 65 歲以下梅毒確定病例數-依居住地

縣市別	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	111 及 112 年 增減幅度
臺北市	1,186	1,046	976	1,032	1,053	1,079	2.5%
新北市	1,651	1,511	1,420	1,625	1,767	1,754	-0.7%
基隆市	129	111	111	107	92	118	28.3%
宜蘭縣	111	132	87	114	128	128	0.0%
連江縣	0	1	1	4	2	1	-50.0%
金門縣	10	5	9	5	10	3	-70.0%
桃園市	871	843	864	828	868	1,079	24.3%
新竹市	126	145	143	139	154	133	-13.6%
新竹縣	131	111	76	128	128	136	6.3%
苗栗縣	88	85	62	108	126	109	-13.5%
臺中市	945	860	886	971	971	1092	12.5%
彰化縣	228	189	161	205	229	229	0.0%
南投縣	116	99	86	96	119	123	3.4%
雲林縣	109	94	105	128	126	130	3.2%
嘉義市	44	47	51	70	65	68	4.6%
嘉義縣	85	62	62	60	61	93	52.5%
臺南市	483	489	457	503	598	509	-14.9%
高雄市	932	975	1,000	1,081	1,049	1,006	-4.1%
屏東縣	318	268	238	259	251	270	7.6%
澎湖縣	29	25	19	12	12	14	16.7%
花蓮縣	117	128	109	110	129	111	-14.0%
臺東縣	68	75	66	71	76	92	21.1%
總計	7,777	7,301	6,989	7,656	8,014	8,277	3.3%

六、65 歲以下梅毒確診通報病例地區分布依性別(如表 2、表 3)，112 年確診通報之居住地，依性別分仍以 6 都為多(男性占 79.3%、女性占 74.3%)，男性部分上升幅度較高縣市為嘉義縣、臺東縣、基隆市、桃園市。女性部分除了宜蘭縣、金門縣、新竹市、彰化縣、雲林縣、臺東縣，其餘縣市之病例數皆有上升。

表 2：各縣市 107-112 年 65 歲以下男性梅毒確定病例數-依居住地

縣市別	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	111 及 112 年 增減幅度
臺北市	1,133	981	942	985	1,000	997	-0.3%
新北市	1,510	1,387	1,327	1,545	1,633	1,560	-4.5%
基隆市	107	97	93	97	87	104	19.5%
宜蘭縣	97	119	78	107	112	116	3.6%
連江縣	-	1	1	4	2	-	-100.0%
金門縣	7	4	6	5	10	3	-70.0%
桃園市	788	776	782	765	762	909	19.3%
新竹市	111	127	132	128	138	117	-15.2%
新竹縣	115	94	60	115	109	100	-8.3%
苗栗縣	70	71	53	87	103	75	-27.2%
臺中市	859	803	816	906	905	979	8.2%
彰化縣	200	160	149	185	199	208	4.5%
南投縣	102	82	76	90	108	100	-7.4%
雲林縣	93	76	90	118	110	118	7.3%
嘉義市	40	39	47	64	59	59	0.0%
嘉義縣	71	51	54	52	53	82	54.7%
臺南市	450	428	419	472	562	455	-19.0%
高雄市	867	903	945	1,017	983	910	-7.4%
屏東縣	278	240	221	238	235	240	2.1%
澎湖縣	27	24	18	12	12	13	8.3%
花蓮縣	104	116	102	100	114	95	-16.7%
臺東縣	55	58	60	67	66	83	25.8%
總計	7,084	6,637	6,471	7,159	7,362	7,323	-0.5%

表 3：各縣市 107-112 年 65 歲以下女性梅毒確定病例數-依居住地

縣市別	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	111 及 112 年 增減幅度
臺北市	53	65	34	47	53	82	54.7%
新北市	141	124	93	80	134	194	44.8%
基隆市	22	14	18	10	5	14	180.0%
宜蘭縣	14	13	9	7	16	12	-25.0%
連江縣	0	0	0	0	0	1	-
金門縣	3	1	3	0	0	0	-
桃園市	83	67	82	63	106	170	60.4%
新竹市	15	18	11	11	16	16	0.0%
新竹縣	16	17	16	13	19	36	89.5%
苗栗縣	18	14	9	21	23	34	47.8%
臺中市	86	57	70	65	66	113	71.2%
彰化縣	28	29	12	20	30	21	-30.0%
南投縣	14	17	10	6	11	23	109.1%
雲林縣	16	18	15	10	16	12	-25.0%
嘉義市	4	8	4	6	6	9	50.0%
嘉義縣	14	11	8	8	8	11	37.5%
臺南市	33	61	38	31	36	54	50.0%
高雄市	65	72	55	64	66	96	45.5%
屏東縣	40	28	17	21	16	30	87.5%
澎湖縣	2	1	1	0	0	1	-
花蓮縣	13	12	7	10	15	16	6.7%
臺東縣	13	17	6	4	10	9	-10.0%
總計	693	664	518	497	652	954	46.3%

淋病相關流行病學資料

- 一、107 至 112 年 65 歲以下淋病確定病例數分別為 4,167、4,469、7,024、7,331、7,959、8,204 例，112 年 65 歲以下淋病確定病例數較 111 年增加 3.1%，其中女性增幅為 7.7%，高於男性增幅 2.6%。(如圖 1)
- 二、在 65 歲以下淋病確定病例性別方面，112 年男性 7,319 例(89.2%)，女性 885 例(10.8%)，男女比例為 8.3：1。(如圖 2)

圖 1：107-112 年 65 歲以下淋病確定病例數趨勢-依性別






圖 2：112 年 65 歲以下淋病確定病例個案性別比



三、依 65 歲以下淋病確診通報病例年齡層分布部分，以 15-34 歲為主，除 25-34 歲及 35-44 歲年齡層通報病例數持平外，其餘各年齡層(0-14 歲、15-24 歲、45-54 歲及 55-64 歲)112 年皆較 111 年通報病例數呈上升趨勢。(如圖 3)

圖 3：107-112 年 65 歲以下淋病確定病例數趨勢-依年齡層



四、再依 65 歲以下淋病確診通報病例之性別及年齡層進一步分析，男性及女性各年齡層狀況如下：

- (一)65 歲以下男性淋病確定病例之年齡層分布以 15-34 歲為多，112 年合計有 5,166 例(占 70.6%)，112 年較 111 年淋病通報病例數以 55-64 歲增幅 14.8%為最多，其次為 15-24 歲，增幅為 4.7%。(如圖 4)
- (二)65 歲以下女性淋病確定病例之年齡層分布以 15-34 歲為多，112 年合計有 684 例(占 77.3%)，112 年較 111 年淋病通報病例數以 0-14 歲增幅 173.3%為最多，其次為 15-24 歲(23.1%)及 25-34 歲(2.2%)。(如圖 5)

圖 4：107-112 年 65 歲以下男性各年齡層淋病確定病例數





圖 5：107-112 年 65 歲以下女性各年齡層淋病確定病例數



五、依 65 歲以下淋病確定病例個案之居住地區分布(如表 1)，112 年確定病例之居住地以 6 都為多(占 74.2%)，上升幅度較高之縣市為澎湖縣、金門縣、屏東縣、臺中市。

表 1：各縣市 107-112 年 65 歲以下淋病確定病例數-依居住地

縣市別	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	111 及 112 年 增減幅度
臺北市	760	839	1,236	1,128	1,141	1,137	-0.4%
新北市	1,037	1,166	1,828	1,738	1,802	1,816	0.8%
基隆市	173	101	216	177	188	193	2.7%
宜蘭縣	28	31	66	117	124	133	7.3%
連江縣	0	0	1	0	0	2	-
金門縣	3	6	3	8	16	25	56.3%
桃園市	506	482	727	865	1,102	990	-10.2%
新竹市	65	85	146	149	162	150	-7.4%
新竹縣	135	152	280	293	285	232	-18.6%
苗栗縣	67	62	123	169	230	194	-15.7%
臺中市	283	312	498	627	684	827	20.9%
彰化縣	87	96	146	195	230	247	7.4%
南投縣	74	82	125	165	165	183	10.9%
雲林縣	54	97	105	108	133	146	9.8%
嘉義市	23	44	45	52	70	58	-17.1%
嘉義縣	37	60	65	83	83	91	9.6%
臺南市	182	212	290	313	308	366	18.8%
高雄市	468	476	818	768	858	955	11.3%
屏東縣	72	58	129	129	112	175	56.3%
澎湖縣	4	8	13	8	7	14	100.0%
花蓮縣	56	57	119	146	159	160	0.6%
臺東縣	53	43	45	93	100	110	10.0%
總計	4,167	4,469	7,024	7,331	7,959	8,204	3.1%

六、65 歲以下淋病確定病例個案之居住地區分布-性別分析資料顯示(如表 2、表 3),112 年確定病例之居住地仍以 6 都為多(男性占 73.9%、女性占 76.9%),男性部分上升幅度較高之縣市為澎湖縣、金門縣、屏東縣、臺中市、臺南市。女性部分上升幅度較高之縣市為屏東縣、臺東縣、金門縣、新竹市、花蓮縣、高雄市、彰化縣。

表 2：各縣市 107-112 年 65 歲以下男性淋病確定病例個案數-依居住地

縣市別	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	111 及 112 年 增減幅度
臺北市	707	784	1,116	1,014	1,011	999	-1.2%
新北市	965	1,079	1,641	1,553	1,627	1,621	-0.4%
基隆市	169	95	199	164	168	178	6.0%
宜蘭縣	26	28	60	108	114	125	9.6%
連江縣	0	0	0	0	0	2	-
金門縣	3	6	3	8	15	22	46.7%
桃園市	467	440	663	783	1,000	889	-11.1%
新竹市	56	76	129	127	146	127	-13.0%
新竹縣	124	143	252	279	260	218	-16.2%
苗栗縣	60	61	119	161	220	186	-15.5%
臺中市	264	276	439	541	570	717	25.8%
彰化縣	83	87	124	178	217	231	6.5%
南投縣	69	77	120	153	146	174	19.2%
雲林縣	51	91	100	94	123	134	8.9%
嘉義市	21	38	41	48	61	52	-14.8%
嘉義縣	36	53	61	76	75	83	10.7%
臺南市	180	202	263	273	267	325	21.7%
高雄市	425	445	740	707	783	859	9.7%
屏東縣	65	58	118	115	104	148	42.3%
澎湖縣	3	7	12	8	7	14	100.0%
花蓮縣	42	48	103	123	127	118	-7.1%
臺東縣	51	41	43	90	96	97	1.0%
總計	3,867	4,135	6,346	6,603	7,137	7,319	2.6%

表 3：各縣市 107-112 年 65 歲以下女性淋病確定病例個案數-依居住地

縣市別	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	111 及 112 年 增減幅度
臺北市	53	55	120	114	130	138	6.2%
新北市	72	87	187	185	175	195	11.4%
基隆市	4	6	17	13	20	15	-25.0%
宜蘭縣	2	3	6	9	10	8	-20.0%
連江縣	0	0	1	0	0	0	-
金門縣	0	0	0	0	1	3	200.0%
桃園市	39	42	64	82	102	101	-1.0%
新竹市	9	9	17	22	16	23	43.8%
新竹縣	11	9	28	14	25	14	-44.0%
苗栗縣	7	1	4	8	10	8	-20.0%
臺中市	19	36	59	86	114	110	-3.5%
彰化縣	4	9	22	17	13	16	23.1%
南投縣	5	5	5	12	19	9	-52.6%
雲林縣	3	6	5	14	10	12	20.0%
嘉義市	2	6	4	4	9	6	-33.3%
嘉義縣	1	7	4	7	8	8	0.0%
臺南市	2	10	27	40	41	41	0.0%
高雄市	43	31	78	61	75	96	28.0%
屏東縣	7	0	11	14	8	27	237.5%
澎湖縣	1	1	1	0	0	0	-
花蓮縣	14	9	16	23	32	42	31.3%
臺東縣	2	2	2	3	4	13	225.0%
總計	300	334	678	728	822	885	7.7%